

GUÍA DE CÓMO USAR ESTA MEDICINA

MIFEPREX[®] (MIF-eh-prex)
(mifepristona) Tabletas, 200mg
Via Oral

Lea esta información cuidadosamente antes de tomar Mifeprex* y misoprostol. Le ayudará a entender cómo funciona el tratamiento. Esta GUÍA DE CÓMO USAR ESTA MEDICINA no reemplaza las conversaciones que Ud. puede tener con su proveedor de servicios de salud (proveedor).

¿Qué es Mifeprex?

Mifeprex se usa para terminar un embarazo temprano. Actúa bloqueando una hormona necesaria para que el embarazo continúe. No se lo ha aprobado para terminar embarazos avanzados. El embarazo temprano se define como uno que ha comenzado 49 días (7 semanas) o menos desde que Ud. tuvo su última menstruación. Si Ud. usa Mifeprex (día 1), también tendrá que tomar otra medicina llamada misoprostol, 2 días después de tomar Mifeprex (día 3), para terminar con su embarazo. Es importante mencionar que de cada 100 mujeres que toman Mifeprex aproximadamente 5-8 necesitarán un procedimiento quirúrgico para terminar el embarazo o contener un sangrado copioso.

¿Cuál es la información más importante que debe saber sobre Mifeprex?

¿Qué síntomas deben preocuparme? Los calambres y el sangrado forman parte del poner fin a un embarazo, sin embargo, muy esporádicamente, después de un aborto espontáneo, un aborto quirúrgico, un aborto médico o un parto, ocurren sangrado, infecciones u otros problemas serios que pueden poner en riesgo su vida. En estos casos se requiere atención médica inmediata. Una seria infección ha resultado en la muerte en un número muy bajo de casos en los cuales se ha usado misoprostol dentro de la vagina. Sin embargo, no existe información de que el uso vaginal de misoprostol fue la causa de estas muertes. Si tiene alguna pregunta, preocupación o problema, o si le preocupa cualquier efecto secundario o síntoma, debe llamar a su proveedor. El número telefónico de su proveedor es _____.

Llame de inmediato a su proveedor si Ud. presenta alguno de los siguientes síntomas:

Hemorragia. Consulte inmediatamente con su proveedor si Ud. ha sangrado lo suficiente como para empapar en una hora dos toallas sanitarias de tamaño normal, durante dos horas consecutivas, o si se siente preocupada por la copiosa hemorragia. Aproximadamente, en 1 de cada 100 mujeres el sangrado puede ser tan copioso que necesita un procedimiento quirúrgico (aborto quirúrgico/D&C) para contenerlo.

Dolor abdominal o “sentirse mal”. Si tiene dolor abdominal, molestia, o si “se siente mal” incluyendo náusea, vómitos, diarrea o debilidad con o sin fiebre, por más de 24 horas después de tomar misoprostol, debe comunicarse de inmediato con su proveedor. Estos síntomas pueden indicar la presencia de una infección seria u otro problema (incluido un embarazo ectópico, es decir un embarazo fuera del útero).

Fiebre. Si en los días posteriores al tratamiento tiene una fiebre de 38°C (100.4°F) ó más, por más de 4 horas, debe comunicarse de inmediato con su proveedor. La fiebre puede ser una síntoma de una infección seria u otro problema (incluido un embarazo ectópico, es decir un embarazo fuera del útero).

Lleve consigo esta GUÍA DE CÓMO UTILIZAR ESTA MEDICINA. En caso de ir a una sala de emergencias o a la oficina de un proveedor distinto al que le dio Mifeprex, lleve consigo esta GUÍA DE CÓMO USAR ESTA MEDICINA, de manera que estén al tanto de que Ud. tiene un aborto médico con Mifeprex.

Qué hacer si Ud. todavía se encuentra embarazada después del tratamiento de Mifeprex con misoprostol. Si todavía sigue embarazada, su proveedor le hablará sobre otras opciones con las que Ud. cuenta, incluyendo un procedimiento quirúrgico para terminar el embarazo. Hay una posibilidad de que ocurran defectos de nacimiento si el embarazo no termina.

Hable con su proveedor. Antes de tomar Mifeprex, Ud. debe leer esta GUÍA DE CÓMO UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO y firmar una declaración (AFIRMACIÓN DE LA PACIENTE). Ud. y su proveedor deben hablar sobre los beneficios y riesgos que tiene para Ud. el uso de Mifeprex.

¿Qué mujeres no deben tomar Mifeprex?

Algunas mujeres no deben tomar Mifeprex. No se debe tomar este medicamento si:

- Ya han pasado más de 49 días (7 semanas) desde que comenzó su última menstruación.
- Ud. usa un dispositivo intrauterino (IUD). Primero debe quitárselo antes de tomar Mifeprex.
- Su proveedor le ha dicho que Ud. tiene un embarazo fuera del útero (embarazo ectópico).
- Ud. tiene problemas con sus glándulas adrenales (insuficiencia adrenal crónica).
- Ud. toma un medicamento para disminuir la viscosidad de su sangre.
- Ud. tiene predisposición a sufrir hemorragias.
- Ud. toma ciertas medicinas con esteroides.
- Ud. no puede regresar para las dos visitas siguientes.
- A Ud. no le es fácil obtener ayuda médica de emergencia en las dos semanas siguientes después de tomar Mifeprex.
- Ud. es alérgica al mifepristone, misoprostol, o a medicinas que contengan misoprostol, tales como Cyotec o Arthrotec.

Hable con su proveedor acerca de todas sus condiciones médicas para averiguar si Ud. puede tomar Mifeprex. También dígame si Ud. fuma al menos 10 cigarrillos cada día.

¿Cómo debo tomar Mifeprex?

- **Día 1 en la oficina de su proveedor:**
 - Lea esta GUÍA DE CÓMO USAR ESTA MEDICINA.
 - Consulte sobre los beneficios y los riesgos de usar Mifeprex para terminar su embarazo.
 - Si está de acuerdo en que Mifeprex es adecuado para Ud., firme la AFIRMACION DE LA PACIENTE.
 - Después de hacerse un examen físico, tome 3 tabletas de Mifeprex.
- **Día 3 en la oficina de su proveedor:**
 - Si todavía está embarazada, tome dos tabletas de misoprostol.
 - Misoprostol puede causar calambres, náusea, diarrea y otros síntomas. Su proveedor la enviará a casa con medicinas para aliviar esos síntomas.
- **Alrededor del Día 14 en la oficina de su proveedor:**
 - Esta siguiente visita es muy importante. Ud. debe regresar a la oficina de su proveedor unos 14 días después de haber tomado Mifeprex para asegurarse que se encuentra bien y que ya no está embarazada.
 - Su proveedor se comprobará de que su embarazo ha terminado completamente. Si no ha terminado, es posible que ocurran defectos de nacimiento. Si todavía se encuentra embarazada, su proveedor discutirá con Ud. otras opciones de tratamiento con las que Ud. cuenta, incluyendo un procedimiento quirúrgico para terminar el embarazo.

¿Qué se debe evitar mientras tomo Mifeprex y misoprostol?

No tome medicamento alguno, sea con receta médica o no (incluidas hierbas medicinales o suplementos alimenticios), en ningún momento durante el período del tratamiento sin antes preguntar a su proveedor acerca de ellos, ya que pueden interferir con el tratamiento. Pregunte a su proveedor con respecto a los medicamentos que puede tomar para el dolor.

Si está amamantando al momento de tomar Mifeprex y misoprostol, consulte con su proveedor si conviene que Ud. deje de amamantar por algunos días.

¿Cuáles son efectos secundarios posibles y probables que ocasiona el uso de Mifeprex?

Es de esperar que con este tratamiento haya calambres y sangrado. Generalmente, estos síntomas indican que el tratamiento está dando los resultados esperados. Pero a veces Ud. puede sufrir de calambres y sangrado, y aún seguir embarazada. Es por eso que debe visitar nuevamente a su proveedor en el día 3, y una vez más alrededor del día 14. Vea "¿Cómo debo tomar Mifeprex?" para mayor información sobre cuándo regresar a su proveedor. Si Ud. no sangra después de tomar Mifeprex, probablemente comenzará a sangrar una vez que tome misoprostol, la medicina que Ud. tomará en el día 3. El sangrado o manchado con gotas de sangre podría presentarse por 9-16 días como promedio y podría durar hasta 30 días. Su sangrado puede ser similar o ser más

abundante que un período normal pero copioso. Es posible que Ud. vea coágulos de sangre y tejido. Esto es de esperarse como parte de la terminación del embarazo.

Otros síntomas normales del tratamiento incluyen diarrea, náusea, vómitos, dolores de cabeza, mareos, dolor en la espalda y cansancio. Estos efectos secundarios disminuyen después del día 3 y generalmente se desaparecen al día 14. Su proveedor le explicará cómo controlar el dolor o cualquier otro efecto secundario.

¿Cuándo debo comenzar el control natal?

Ud. podría quedar embarazada en cuanto termine su embarazo. Si Ud. no lo desea nuevamente, comience a usar un método anticonceptivo tan pronto como termine su embarazo o antes de comenzar a tener relaciones sexuales.

* * *

A menudo las medicinas se recetan por razones distintas a las mencionadas en la GUÍA DE CÓMO USAR ESTA MEDICINA. Para mayor información, pida a su proveedor los informes sobre Mifeprex que han sido redactados para los profesionales de la salud. Si tiene alguna pregunta, consulte con su proveedor.

Esta GUÍA DE CÓMO USAR ESTA MEDICINA ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

Rev 2: 07/19/05

* Mifeprex es una marca registrada de Danco Laboratories, LLC.

Danco Laboratories, LLC

P.O. Box 4816
New York, NY 10185

1.877.4 EARLY OPTION
(1.877.432.7596)

www.earlyoptionpill.com