

LAS RESPUESTAS
QUE NECESITA PARA
TOMAR UNA DECISIÓN
INFORMADA SOBRE



Mifeprex[®]
(Mifepristona)
Tabletas, 200 mg

LA PÍLDORA ORIGINAL DE
OPCIÓN TEMPRANA

AVERIGÜE POR QUÉ MÁS
MUJERES ELIGEN ESTA OPCIÓN
APROBADA POR LA FDA PARA
UN ABORTO NO QUIRÚRGICO
TEMPRANO EN LOS PRIMEROS
70 DÍAS DE EMBARAZO.

Pregúntenos acerca de
Mifeprex®

*“Me gustó
la privacidad
de este
procedimiento
durante un
momento difícil”.*



Hable con su proveedor de atención médica. Antes de tomar MIFEPREX*, debe leer esta guía de medicamento y tanto usted como su proveedor de atención médica deben discutir los beneficios y los riesgos de que usted tome MIFEPREX.

¿QUÉ HACE DE MIFEPREX UNA BUENA OPCIÓN PARA TERMINAR UN EMBARAZO TEMPRANO EN LOS PRIMEROS 70 DÍAS DE GESTACIÓN?

MIFEPREX es la única opción no quirúrgica, aprobada por la Food and Drug Administration (FDA), para un aborto temprano que ha estado disponible para las mujeres de EE. UU. por más de 15 años. En estudios clínicos de EE. UU., el régimen de MIFEPREX demostró que es eficaz en un 93 a 98% para terminar el embarazo de forma segura (entre un 2 a 7% las mujeres necesitarán un procedimiento quirúrgico para terminar el embarazo o detener el sangrado abundante). Con este historial de seguridad y eficacia, su uso continúa en aumento.

¿QUÉ TIPO DE EFECTOS SECUNDARIOS PUEDO ESPERAR?

A pesar de que los calambres y el sangrado son síntomas esperados al poner fin a un embarazo, en raras ocasiones pueden ocurrir sangrado, infecciones u otros problemas graves y posiblemente mortales luego de un aborto espontáneo, aborto quirúrgico, aborto médico o parto. En estos casos es necesario buscar atención médica tan pronto como sea posible. En una pequeña cantidad de casos se han dado infecciones graves que resultaron en la muerte en mujeres que han tomado el régimen de MIFEPREX para terminar su embarazo. No hay información de que estos medicamentos causaron estas muertes.

COMUNÍQUESE CON SU PROVEEDOR DE INMEDIATO SI TIENE ALGUNO DE LO SIGUIENTE:

SANGRADO ABUNDANTE: Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si sangra tanto como para llenar dos toallitas sanitarias gruesas de tamaño normal por hora durante dos horas consecutivas o si le preocupa el sangrado profuso. En 1 de cada 100 mujeres, el sangrado puede ser tal que requiere un procedimiento quirúrgico (aborto quirúrgico o D&C).

*MIFEPREX es una marca registrada de Danco Laboratories, LLC.

DOLOR ABDOMINAL O “SENTIRSE ENFERMA”: Si siente dolor abdominal o malestar, o si se “siente enferma”, incluyendo debilidad, náuseas, vómitos o diarrea, con o sin fiebre, por más de 24 horas después de tomar misoprostol, debería comunicarse con su proveedor de atención médica sin demora. Estos síntomas pueden ser señal de una infección grave o de otro problema (incluyendo un embarazo ectópico, un embarazo fuera del útero).

FIEBRE: En los días posteriores al tratamiento, si tiene fiebre de 100.4 °F o más, que perdura más de 4 horas, debería comunicarse con su proveedor de atención médica inmediatamente. La fiebre puede ser un síntoma de una infección grave o de otro problema.

Se espera que los calambres y el sangrado sean parte de este tratamiento. Las pacientes pueden esperar un sangrado o manchado durante un promedio de 9 a 16 días. Los efectos secundarios más comunes pueden incluir, náuseas, debilidad, fiebre/escalofríos, vómitos, dolor de cabeza, diarrea o mareos. Su proveedor discutirá cómo manejar el dolor o los efectos secundarios. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de MIFEPREX. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoría médica sobre cualquier efecto secundario que le moleste o no desaparezca.

¿CÓMO FUNCIONA ESTA PÍLDORA DE OPCIÓN TEMPRANA?

Debido a que MIFEPREX se toma por vía oral, no requiere cirugía ni anestesia en la mayoría de casos. MIFEPREX es una píldora que bloquea una hormona que se necesita para que su embarazo continúe. Cuando utiliza MIFEPREX el Día 1, también necesita tomar otro medicamento, misoprostol, 24 a 48 horas después de tomar MIFEPREX para causar que el embarazo pase del útero. La guía de medicamento de MIFEPREX, que recibirá en su primera visita, le explica en más detalle cómo funciona el régimen y qué esperar.

“Yo elegí Mifeprex porque deseaba evitar la cirugía, si era posible”.



¿ES MIFEPREX ADECUADO PARA MÍ?

MIFEPREX se puede tomar únicamente durante los primeros 70 días (10 semanas) del embarazo y no se puede usar en casos de un embarazo ectópico posible o confirmado, ya que MIFEPREX no es eficaz para terminar esos embarazos. Si está usando un IUD (dispositivo o sistema intrauterino) debe retirarlo antes de tomar MIFEPREX. Hable con su proveedor de atención médica para saber si MIFEPREX es la opción adecuada para usted. Además, asegúrese de informarle a su proveedor si está tomando cualquier otro medicamento.

¿CÓMO SE PROPORCIONARÁ ESTA OPCIÓN PRIVADA?

MIFEPREX está disponible únicamente en consultorios médicos, clínicas y hospitales en todo el país.

- **Día 1:** tome 1 tableta de MIFEPREX por vía oral
- **24 a 48 horas después de tomar MIFEPREX:** coloque 2 tabletas de misoprostol en la mejilla (área entre la mejilla y los dientes)

Usted y su proveedor de atención médica determinarán el lugar más apropiado para que usted tome misoprostol, ya que puede causar sangrado, calambres, náuseas, diarrea y otros síntomas que por lo general comienzan entre 2 a 24 horas después de tomarlo.

En la mayoría de las mujeres, el embarazo llegará a su fin entre 2 a 24 horas después de tomar las tabletas de misoprostol.

Se necesita una evaluación de seguimiento aproximadamente 7 a 14 días después para asegurarse de que el embarazo haya terminado. Esta es una evaluación muy importante. Si el embarazo continúa, la posibilidad de que existan defectos de nacimiento se desconoce, así que su proveedor de atención médica hablará con usted sobre un procedimiento quirúrgico para terminar el embarazo.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo tomar el régimen de MIFEPREX lea la guía de medicamento y discuta cualquier pregunta que pueda tener con su proveedor de atención médica.

¿RECIBIRÉ EL ASESORAMIENTO Y EL APOYO QUE NECESITO?

El apoyo y el asesoramiento están fácilmente disponibles para usted durante todo el proceso. Si tiene preguntas de rutina, puede llamar al personal de su proveedor durante el horario normal. Su proveedor de atención médica le proporcionará otro número de teléfono a donde llamar en caso de emergencia. Lleve consigo su guía del medicamento si va a una sala de emergencias o un proveedor diferente al que le recetó su MIFEPREX, para que ellos sepan que usted está teniendo un aborto médico con MIFEPREX.

¿POR QUÉ MÁS MUJERES ELIGEN MIFEPREX?

Más de 3 millones de mujeres en Estados Unidos y millones de mujeres más en el mundo han elegido esta opción.

- **ES UNA OPCIÓN PRIVADA PARA TERMINAR UN EMBARAZO DE MANERA SEGURA.**
- **EN LA MAYORÍA DE CASOS LE PERMITE EVITAR LA CIRUGÍA Y LA ANESTESIA.**
- **ESTÁ DISPONIBLE EN FORMA DE PÍLDORA.**

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Para conocer más acerca de MIFEPREX, llame a nuestra línea directa, las 24 horas del día, al:

**1-877-4-EARLY OPTION
(1-877-432-7596)**

O visite: www.earlyoptionpill.com



“Mifeprex ha sido usado por más de 3 millones de mujeres estadounidenses como yo”.

¿Dónde puedo obtener más información?
Para conocer más acerca de MIFEPREX®,
llame a nuestra línea directa, disponible las
24 horas del día, al:

1-877-4-EARLY OPTION
(1-877-432-7596)

O visite nuestro sitio web en:
www.earlyoptionpill.com



DANCO

Apoyo • Progreso • Opciones