

دليل Mifeprex® المرفق تمت مراجعته في يناير عام 2023

دليلك المرفق للإجهاض الدوائي

أقرص MIFEPREX® (ميفيريستون)، 200 مليغرام
حبوب خيار الإجهاض المبكر الأصلية.

أول نظام دوائي معتمد من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية للإجهاض المبكر

تحدثني مع موفر رعايتك الصحية. قبل تناولك Mifeprex، يجب عليك قراءة دليل الدواء هذا، وعليك أنت وموفر رعايتك الصحية مناقشة فوائد Mifeprex وأضراره.

هل MIFEPREX مناسب لي؟

يتيح لك MIFEPREX القدرة على الإجهاض حتى 70 يومًا (10 أسابيع) من بداية الحمل، ولا يمكن استخدامه في حالات الحمل خارج الرحم المؤكد أو المشتبه به (الحمل خارج الرحم) لأن MIFEPREX غير فعال لإنهاء تلك الحمل. وإذا كنت تستخدمين لولبًا (نظام أو جهاز داخل الرحم (IUD))، فيجب إزالته قبل تناول MIFEPREX. استشيرني موفر رعايتك الصحية عما إذا كان MIFEPREX هو الخيار المناسب لك. واحرصي على إخبار موفر رعايتك إذا ما كنت تتناولين أدوية أخرى. للاطلاع على القائمة الكاملة لأسباب عدم مناسبة MIFEPREX لك، يُرجى مراجعة الدليل الدوائي المرفق.

المشورة والدعم

يوفر لك اختيار MIFEPREX للإجهاض الدوائي خيارًا أكثر خصوصية من الإجهاض الجراحي، مع توفير الدعم والمشورة بسهولة طوال العملية. أنت لست بمفردك، ومن الطبيعي طلب مساعدة إضافية في أثناء الإجهاض الدوائي وبعده. إذا كانت لديك أسئلة أو إذا كنت تريد الحصول على مزيد من مصادر المعلومات، يمكنك التحدث مع موفر رعايتك الصحية؛ فهو يستطيع إرشادك في أثناء العملية ويساعدك في تحديد أي خيارات دعم هي الأنسب لحالتك.

التخطيط لإجراء إجهاضك الدوائي باستخدام MIFEPREX:

سيطلب منك موفر رعايتك الصحية قراءة موافقة المريض والتوقيع عليها، وسيزودك بدليل الدواء والإرشادات ومعلومات الاتصال. وسيُرشدك موفر رعايتك حول كيفية تناول MIFEPREX وسيناقشك حول المكان الأنسب لك لتناول أقرص ميزوبروستول. ستحصلين على قرص واحد من MIFEPREX وأربعة أقرص ميزوبروستول؛ وربما يكتب لك موفر رعايتك وصفة طبية كي تحصلي عليهم من الصيدلية.

دليل Mifeprex® المرفق
تمت مراجعته في يناير عام 2023

اليوم الأول
تناولي قرصًا واحدًا من MIFEPREX عن طريق الفم

دوني تاريخ ووقت تناولك قرص MIFEPREX: _____

اليومين الثاني والثالث
من 24 إلى 48 ساعة بعد تناول MIFEPREX

ضعي قرصين ميزوبروستول (إجمالي 4 أقراص) بجانب كل خذ لمدة 30 دقيقة ثم ابتلعي ما تبقى منهم مع الماء أو أي سائل آخر.

خلال ساعتين إلى 24 ساعة، ستشعرين بتقلصات ونزيف يتبعهما نزول دم قد يستمر لعدة أيام.

أبقيهما بجانب خديك لمدة 30 دقيقة

دوني تاريخ ووقت تناولك أقراص ميزوبروستول: _____

من اليوم السابع حتى الرابع عشر

من المهم جداً أن تتابعي مع موفر رعايتك الصحية للتأكد من أنك بصحة جيدة ولم تعودي حاملاً. إن MIFEPREX شديد الفعالية في إنهاء الحمل المبكر، حوالي 2 إلى 7 من كل 100 امرأة ستحتاج إلى إجراء جراحي للمتابعة لإكمال عملية إنهاء الحمل أو لوقف النزيف.

دوني جدول مواعيد متابعتك مع موفر رعايتك الصحية: _____

يمكنك الحمل مجدداً مباشرة بعد إنهاء حملك. وإذا كنت لا تريدين الحمل مجدداً، تحدثي مع موفر رعايتك الصحية حول ذلك. فيمكنه مناقشة الخيارات المتاحة لك ومساعدتك على اختيار الوسيلة الأفضل لمنع الحمل لك.

دليل Mifeprex® المرفق تمت مراجعته في يناير عام 2023

انظر أدناه لمعرفة الأعراض التي تتطلب عناية طبية فورية.

احرصي على الاتصال بموفر رعايتك الصحية على الفور إذا عانيت أي من الأعراض الآتية:

نزيف حاد: يكفي لملء فوطتين صحيتين سمكيتين كبيرتي المقاس كل ساعة لمدة ساعتين متتاليتين أو إذا كنت تشعرين بالقلق من النزيف الحاد.

ما هي كمية نزيفك؟

- كمية ضئيلة: ظهور الدماء على المنديل فقط عند المسح أو ظهور بقعة حجمها أصغر من بوصة واحدة على فوطة صحية سميكة خلال ساعة واحدة.
- كمية صغيرة: ظهور بقعة حجمها أصغر من أربع بوصات على فوطة صحية سميكة خلال ساعة واحدة.
- كمية متوسطة: ظهور بقعة حجمها أصغر من ست بوصات على فوطة صحية سميكة خلال ساعة واحدة.
- كمية كبيرة: تشبُّع الفوطة الصحية السميكة خلال ساعة واحدة.

ألم في البطن أو "الشعور بالإعياء": بما في ذلك الوهن والغثيان والقيء والإسهال مع وجود حمى أو بدونها، بعد مرور أكثر من 24 ساعة من تناول الميزوبروستول. قد تكون هذه الأعراض إشارة إلى عدوى خطيرة أو مشكلة أخرى (بما في ذلك الحمل المنتبذ وهو الحمل خارج الرحم).

- وجود حُمى بدرجة حرارة 100.4 درجة فهرنهايت أو أعلى خلال الأيام التي تلي العلاج، واستمرارها لأكثر من 4 ساعات. قد تكون الحُمى عَرَض لعدوى خطيرة أو مشكلة أخرى.
- 100.4 درجة فهرنهايت أو أعلى لمدة أكثر من 4 ساعات.

إذا كنت لا تستطيعين الوصول إلى موفر رعايتك الصحية، فذهبي إلى أقرب غرفة طوارئ مستشفى.

هل تحتاجين إلى المزيد من المعلومات؟ إذا كان لديك أسئلة أكثر عن MIFEPREX أو الإجهاض الدوائي أو ما قد تتعرضين له أو ما قد تواجهينه بعد العلاج، اتصلي بموفر رعايتك الصحية.

موفر رعايتي الصحية: _____

رقم الهاتف: _____

من أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

لمعرفة المزيد عن MIFEPREX، يُرجى الاتصال بالخط الساخن لدينا المتاح على مدار 24 ساعة:

1-877-4-EARLY OPTION (1-877-432-7596)

أو زيارة: www.earlyoptionpill.com