

¿ES MIFEPREX ADECUADO PARA MÍ?

MIFEPREX permite actuar en los primeros meses, hasta los 70 días (10 semanas) de embarazo, y no puede utilizarse en casos de embarazo ectópico confirmado o sospechado (un embarazo fuera del útero), ya que MIFEPREX no es eficaz para interrumpir esos embarazos. Si está utilizando un DIU (dispositivo o sistema intrauterino), debe retirárselo antes de tomar MIFEPREX. Consulte con su proveedor de atención médica si MIFEPREX es la opción adecuada para usted. Además, asegúrese de informar a su proveedor si está tomando algún otro medicamento. Para obtener una lista completa de las razones por las que MIFEPREX puede no ser adecuado para usted, consulte la Guía del medicamento adjunta.

ASESORAMIENTO Y APOYO

La elección de MIFEPREX para un aborto con medicamentos le ofrece una opción más privada que el aborto quirúrgico, con apoyo y asesoramiento disponibles durante todo el proceso. Usted no está sola y es habitual buscar más apoyo durante y después del aborto con medicamentos. Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, hable con su proveedor de atención médica. que puede guiarla a lo largo del proceso. Además, hablará con usted acerca del tipo de apoyo que más le conviene.

PLANIFICACIÓN DEL ABORTO FARMACOLÓGICO CON MIFEPREX:

Su proveedor de atención médica le solicitará que lea y firme el Acuerdo del paciente y le dará una Guía del medicamento, instrucciones e información de contacto. Su proveedor le dará instrucciones sobre cómo tomar MIFEPREX y le indicará un lugar adecuado para que tome los comprimidos de misoprostol. Se le dará 1 comprimido de MIFEPREX y cuatro comprimidos de misoprostol; es posible que su proveedor le haga una receta para que las adquiera en una farmacia.



TOME 1 COMPRIMIDO DE MIFEPREX POR VÍA ORAL



ANOTE LA FECHA Y LA HORA EN QUE TOMA MIFEPREX: _



24-48 HORAS DESPUÉS DE TOMAR MIFEPREX



Coloque 2 comprimidos de misoprostol (4 comprimidos en total) en cada mejilla durante 30 minutos y trague el sobrante con un vaso de agua u otro líquido.

En el plazo de 2 a 24 horas es posible que tenga calambres y sangrado seguidos de hemorragia uterina escasa, que puede durar varios días.



ANOTE LA FECHA Y LA HORA EN QUE TOMA LAS COMPRIMIDOS DE MISOPROSTOL:



Es muy importante que haga un seguimiento con su proveedor de atención médica para asegurarse de que se encuentra bien y de que ya no está embarazada. MIFEPREX es muy eficaz en la interrupción del embarazo en los primeros meses, aproximadamente de 2 a 7 de cada 100 mujeres necesitarán una intervención quirúrgica de seguimiento para completar el proceso de interrupción del embarazo o para detener el sangrado.

ANOTE SU CALENDARIO DE SEGUIMIENTO CON SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA: .

Puede volver a quedarse embarazada inmediatamente después de interrumpir el embarazo. Si no desea volver a quedarse embarazada, hable con su proveedor de atención médica. Pueden hablarle de las opciones y ayudarle a elegir el mejor método anticonceptivo para usted.













Consulte a continuación los síntomas que requieren atención médica inmediata.

COMUNÍQUESE CON SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO SI EXPERIMENTA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS:

SANGRADO ABUNDANTE: Suficiente como para empapar 2 toallas sanitarias gruesas de tamaño normal por hora durante 2 horas consecutivas o si le preocupa la posibilidad de un sangrado intenso.



¿CUÁNTO SANGRA?



CANTIDAD ESCASA:

Sangre solo en el papel al limpiarse o mancha de menos de una pulgada en la toalla higiénica en el plazo de una hora.



CANTIDAD LEVE:

Mancha de menos de cuatro pulgadas en la toalla higiénica en el plazo de una hora.



CANTIDAD MODERADA:

Mancha de menos de seis pulgadas en la toalla higiénica en el plazo de una hora.



CANTIDAD ABUNDANTE:

Mancha en la toalla higiénica en el plazo de una hora.



DOLOR ABDOMINAL O "SENSACIÓN DE MALESTAR": Incluida la debilidad, las náuseas, los vómitos o la diarrea, con o sin fiebre, más de 24 horas después de tomar misoprostol. Estos síntomas pueden ser signo de una infección grave u otro problema (incluido un embarazo ectópico, un embarazo fuera del útero).



O MÁS DE 4 FIEBRE: En los días posteriores al tratamiento tiene fiebre de 100.4 °F o superior, que dura más de 4 horas. La fiebre puede ser síntoma de una infección grave o de otro problema.

SI NO PUEDE COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA, ACUDA AL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MÁS CERCANO.



¿NECESITA MÁS INFORMACIÓN?

Si tiene más preguntas sobre MIFEPREX, el aborto con medicamentos, qué esperar o su experiencia después del tratamiento, comuníquese con su proveedor de atención médica.

MI PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA: _	
NÚMERO DE TELÉFONO:	





"Mifeprex
ha sido usado
por más de
5 millones pacientes
de estadounidenses
Como nosotros."

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Para obtener más información sobre MIFEPREX, llame a nuestra línea directa las 24 horas al:

1-877-4-EARLY OPTION (1-877-432-7596)

O visite: www.earlyoptionpill.com



