

Mifeprex® 使用指南

2023 年 1 月修訂

藥物流產使用指南

MIFEPREX® (美服培酮) 片, 200 mg
原創早期墮胎藥物。

唯一經 FDA (美國食品藥物管理局) 批准的早期墮胎藥物方案

與您的醫療健保提供者討論。在服用 MIFEPREX 之前, 您應閱讀服藥說明, 並且您和您的醫療健保提供者應討論服用 MIFEPREX 的益處和風險。

MIFEPREX 適合您使用嗎?

MIFEPREX 可令您終止最長 70 天 (10 週) 的妊娠, 但不能在已確認或疑似異位妊娠 (子宮外孕) 的情形下使用, 因為 MIFEPREX 對於終止此類妊娠無效。如果您正在使用 IUD (子宮內避孕器或避孕系統), 則必須在服用 MIFEPREX 之前將其取出。與您的醫療健保提供者討論 MIFEPREX 是否適合您。同時請務必告知您的醫療健保提供者, 您是否在服用任何其他藥物。如欲知 MIFEPREX 可能不適合您的完整原因清單, 請查看隨附的「用藥指南」。

諮詢和支援

選擇 MIFEPREX 作為藥物流產方式可為您提供較手術流產更為私密的選擇, 並且其全程配有支援和諮詢服務。您並不孤單, 在藥物流產過程中及之後尋求額外支援非常常見。如果您有問題或是想要更多資訊類資源, 請告知您的醫療健保提供者; 他們可以幫助您度過此流程, 並與您討論哪種類型的支援方案將最適合您。

規劃您的 MIFEPREX 藥物流產:

您的醫療健保提供者將要求您閱讀並簽署患者協議, 並為您提供用藥指南、說明和聯絡資訊。醫療健保提供者將指導您如何服用 MIFEPREX, 並討論出服用米索前列醇 (misoprostol) 片的適當地點。您將獲得 1 片 MIFEPREX 和 4 片米索前列醇; 您的醫療健保提供者將為您提供處方, 以便您在藥房取藥。

Mifeprex® 使用指南

2023 年 1 月修訂

第 1 天

口服 1 片 MIFEPREX

記錄下服用 MIFEPREX 的日期和時間：_____

第 2-3 天

服用 MIFEPREX 後 24-48 小時

在兩側口腔頰中各含 2 片米索前列醇（總計 4 片）30 分鐘，然後用水或其他液體送服任何殘留藥物。

在服藥後的 2-24 小時內，您預期會出現絞痛和出血，之後會出現可能持續數天的點滴出血。

含在兩側口腔頰中 30 分鐘

記錄下服用米索前列醇片的日期和時間：_____

第 7-14 天

與您的醫療健保提供者保持跟進，以確保您的身體狀態良好，不再處於妊娠狀態，這非常重要。MIFEPREX 對於終止早期妊娠非常有效，在 100 名女性中約有 2-7 人需要後續手術程式才能完成妊娠終止流程或停止出血。

記錄下您與醫療健保提供者的隨診時間表：_____

妊娠結束之後，您就可以再次懷孕。如果您不想再次懷孕，請與您的醫療健保提供者討論。他們可以與您討論方法，並與您共同選擇最適合您的避孕方法。

Mifeprex® 使用指南

2023 年 1 月修訂

查看下方需要立即就醫的症狀。

如果您出現下列任何症狀，請立即聯絡您的醫療健保提供者：

大量出血：連續 2 小時出血，每小時的血量足以浸透 2 條全尺寸厚衛生棉，或您擔心大量出血。

您的出血量是多少？

- 極少量：擦拭時僅紙巾上有血跡，或一小時內的出血量在衛生棉上留漬不足一英寸。
- 少量：一小時內的出血量在衛生棉上留漬不足四英寸。
- 中量：一小時內的出血量在衛生棉上留漬不足六英寸。
- 大量：一小時內浸透衛生棉。

在服用米索前列醇後 24 小時以上感到腹痛或「不舒服」：包括虛弱、噁心、嘔吐或腹瀉，伴有或不伴有發燒。這些症狀可能是嚴重感染或其他問題的先兆（包括異位妊娠、子宮外妊娠）。

發燒：在治療後出現持續 4 小時以上的 100.4°F 或以上的發燒。發燒可能是嚴重感染或其他問題的症狀。

- 發燒 100.4°F 或以上超過 4 小時

如果您無法聯絡到醫療健保提供者，請前往最近的醫院急診室。

需要更多資訊？如果您有關於 MIFEPREX、藥物流產、預期內容或治療後體驗的更多問題，請聯絡您的醫療健保提供者。

我的醫療健保提供者：_____

電話號碼：_____

我可以在哪裡獲取更多資訊？

如欲了解關於 MIFEPREX 的更多資訊，請撥打我們的 24 小時熱線：

1-877-4-EARLY OPTION (1-877-432-7596)

或造訪網站：www.earlyoptionpill.com