

Mifeprex® (Mifepristone)

Tablets, 200 mg

دليل الدواء

أقراص Mifeprex (MIF-eh-prex) (ميفيبريستون)، للاستخدام عن طريق الفم

اقرأ هذه المعلومات بعناية قبل تناول Mifeprex* والميزوبروستول. فهي ستساعدك على معرفة كيفية عمل العلاج. لا يُغني دليل الدواء هذا عن التحدث مع موفر رعايتك الصحية.

ما هي أهم المعلومات التي يجب عليّ معرفتها عن Mifeprex؟

ما هي الأعراض التي عليّ القلق بشأنها؟ مع أن التقلصات والنزيف هما جزءان يُتوقع حدوثهما في أثناء عملية إنهاء الحمل، إلا أنه من النادر حدوث نزيف أو التهابات أو مشكلات أخرى خطيرة أو يُحتمل أنها تكون مهددة للحياة بعد الإجهاض التلقائي أو الإجهاض الجراحي أو الإجهاض الدوائي أو الوضع. يجب الحصول على الرعاية الطبية في أسرع وقت ممكن في تلك الحالات. أدى الالتهاب الحاد إلى الوفاة لدى حالات قليلة جدًا. ليس هناك معلومات تفيد بأن استخدام Mifeprex والميزوبروستول هما سبب تلك الوفيات. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف أو مشكلات أو إذا كنت قلقة بشأن أيًا من الآثار الجانبية أو الأعراض، عليك الاتصال بموفر رعايتك الصحية. يمكنك كتابة رقم هاتف موفر رعايتك الصحية هنا _____.

احرصي على الاتصال بموفر رعايتك الصحية على الفور إذا عانيت أي من الأعراض الآتية:

• **نزيف حاد.** اتصل بموفر رعايتك الصحية على الفور إذا كان نزيفك يكفي لملء فوطتين صحييتين سميكتين كبيرتي المقاس كل ساعة لمدة ساعتين متتاليتين أو إذا كنت تشعرين بالقلق من النزيف الحاد. قد تصاب امرأة واحدة من كل 100 امرأة بنزيف حاد يتطلب تدخل جراحي (الشفط الجراحي أو التوسيع والكحت).

• **ألم في البطن أو "الشعور بالإعياء".** إذا كنت تعانين من ألم في البطن أو اضطرابات أو "الشعور بالإعياء"، بما في ذلك المعاناة من وهن أو غثيان أو تقيؤ أو إسهال مع وجود حمّى أو بدونها، واستمرار الأعراض لأكثر من 24 ساعة بعد تناول الميزوبروستول، فيجب عليك الاتصال بموفر رعايتك الصحية دون تأخير. قد تكون هذه الأعراض إشارة إلى عدوى خطيرة أو مشكلة أخرى (بما في ذلك الحمل المنتبذ وهو الحمل خارج الرحم).

• **الحمّى.** إذا عانيت من حمّى بدرجة حرارة 100.4 فهرنهايت أو أعلى خلال الأيام التي تلي العلاج، واستمرت لأكثر من 4 ساعات، فيجب عليك الاتصال بموفر رعايتك الصحية على الفور. قد تكون الحمّى عرضًا لعدوى خطيرة أو مشكلة أخرى.

إذا كنت لا تستطيعين الوصول إلى موفر رعايتك الصحية، فاذهي إلى أقرب غرفة طوارئ بمستشفى.

ما عليك فعله إذا استمر حملك بعد علاج Mifeprex والميزوبروستول. إذا كنت لا تزالين حاملًا، فإن موفر رعايتك الصحية سيتحدث معك عن تدخل جراحي لإنهاء حملك. في معظم الحالات، يمكن إجراء التدخل الجراحي في العيادة/المستوصف. فرصة حدوث تشوهات خلقية في حال عدم إنهاء الحمل غير معروفة.

تحديثي مع موفر رعايتك الصحية. قبل تناولك Mifeprex، يجب عليك قراءة دليل الدواء هذا، وعليك أنت وموفر رعايتك الصحية مناقشة فوائد Mifeprex وأضراره.

ما هو Mifeprex؟

يُستخدم Mifeprex ضمن نظام دوائي مع دواء موصوف آخر يُسمى ميزوبروستول لإنهاء حمل مبكر.

يعني الحمل المبكر مرور 70 يومًا (10 أسابيع) أو أقل منذ بدء آخر دورة شهرية لك. غير مصرح باستخدام Mifeprex لإنهاء الحمل الأطول مدة من ذلك. يحجب Mifeprex الهرمون اللازم لاستمرار الحمل. عند استخدامك Mifeprex في اليوم الأول، يجب عليك أيضًا تناول دواء آخر يُسمى ميزوبروستول بعد 24 إلى 48 ساعة من تناولك Mifeprex، لإخراج الحمل من رحمك.

من المرجح خروج الحمل من الرحم في غضون ساعتين إلى 24 ساعة بعد تناول Mifeprex وميزوبروستول. عند خروج الحمل من الرحم، ستصابين بنزيف وتقلصات أقوى من دورتك الشهرية المعتادة. حوالي 2 إلى 7 من كل 100 امرأة تتناول Mifeprex ستحتاج إلى إجراء جراحي لأن الحمل لم ينتقل من الرحم تمامًا أو لوقف النزيف.

من التي عليها عدم تناول Mifeprex؟

يجب على بعض النساء عدم تناول Mifeprex. لا تتناولي Mifeprex إذا:

- كانت فترة حملك أكثر من 70 يومًا (10 أسابيع). يجب على موفر رعايتك الصحية إجراء اختبار سريري أو اختبار بالموجات فوق الصوتية أو أي اختبار آخر لتحديد فترة حملك.
- تستخدمين لولب (نظام أو جهاز داخل الرحم). يجب عليك إزالته قبل تناول Mifeprex.
- أخذك موفر رعايتك الصحية أن حملك خارج الرحم (حمل منتبذ).
- تعانين من مشكلات في الغدد الكظرية (فشل الغدة الكظرية المزمن).
- تتناولين أدوية سيولة الدم.
- تعانين من مشكلة نزيف.
- تعانين من البورفيريا.
- تتناولين أدوية ستيرويدية معينة.
- لديك حساسية تجاه الميفيبيريستون أو الميزوبروستول أو الأدوية التي تحتوي على الميزوبروستول، مثل Cytotec أو Arthrotec.
- اسألني موفر رعايتك الصحية إذا لم تكوني متأكدة من جميع حالاتك الطبية قبل تناول هذا الدواء لمعرفة ما إذا كان يمكنك تناول Mifeprex أم لا.

ما الذي يجب أن أخبر موفر رعايتي الصحية به قبل تناول Mifeprex؟


قبل تناول Mifeprex، عليك إخبار موفر رعايتك الصحية إذا كنت:

- لا تستطيعين الحضور لزيارة المتابعة خلال 7 إلى 14 يومًا تقريبًا من زيارتك الأولى.
- مرضعة. لأن Mifeprex يمكنه الوصول إلى حليب الثدي. إن تأثير نظام Mifeprex والميزوبروستول على الرضيع أو على إنتاج حليب الرضاعة غير معروف.
- تتناولين أدوية بما في ذلك أدوية بوصفة أو بدون وصفة طبية، وفيتامينات ومكملات غذائية عشبية. قد يؤثر Mifeprex وبعض الأدوية الأخرى على بعضها البعض إذا تم استخدامها معًا. قد يسبب هذا آثارًا جانبية.

كيف يجب تناول Mifeprex؟

- سيُعطيك موفر رعايتك الصحية Mifeprex في المستوصف أو العيادة أو المستشفى.
- ستخططين أنت وموفر رعايتك الصحية بشأن المكان الأنسب لك لتناول الميزوبروستول، لأنه قد يسبب نزيفًا وتقلصات وغثيان وإسهال وأعراض أخرى عادة ما تبدأ بالظهور خلال ساعتين إلى 24 ساعة من تناوله.
- تتخلص معظم النساء من حملهن خلال ساعتين إلى 24 ساعة من تناول أقراص الميزوبروستول.

اتبعي الإرشادات الآتية حول كيفية تناول Mifeprex والميزوبروستول
Mifeprex (قرص واحد) عن طريق الفم + الميزوبروستول (4 أقراص) شدي



الشكل أ (قرصان بين خدك الأيسر ولتتك وقرصان بين خدك الأيمن ولتتك).

اليوم الأول:

- تناولي قرص Mifeprex واحد عن طريق الفم.

بعد 24 إلى 48 ساعة من تناول Mifeprex:

- تناولي 4 أقراص من الميزوبروستول عن طريق وضع قرصين بجانب كل خد (المنطقة بين أسنانك وخدك - راجعي الشكل أ) لمدة 30 دقيقة ثم ابتلعي ما تبقى منهم مع شرب الماء أو سائل آخر.
- قد لا يعمل الدواء بالشكل الجيد إذا تناولت الميزوبروستول قبل مرور 24 ساعة أو بعد 48 ساعة من تناول Mifeprex.
- عادة ما يُسبب الميزوبروستول تقلصات وغثيان وإسهال وأعراض أخرى. قد يُرسل موفر رعايتك الصحية معك إلى المنزل أدوية لتلك الأعراض.

تقييم المتابعة من اليوم السابع حتى الرابع عشر:

- إن تقييم المتابعة أمر في غاية الأهمية. يجب عليك المتابعة مع موفر رعايتك الصحية بعد حوالي 7 إلى 14 يومًا بعد تناولك Mifeprex لتتأكد من أنك على ما يُرام ومن توقف نزيفك وخروج الحمل من رحمك.
- سيقم موفر رعايتك الصحية ما إذا كان الحمل قد خرج من رحمك أم لا. إن احتمال وجود تشوهات خلقية في حال استمرار الحمل غير معروف. إذا كنت لا تزالين حاملاً، فإن موفر رعايتك الصحية سيتحدث معك عن تدخل جراحي لإنهاء حملك.
- إذا انتهى حملك ولكنه لم يخرج بالكامل من رحمك، فإن موفر رعايتك الصحية سيتحدث معك حول الخيارات الأخرى المتاحة لك والتي تشمل إما الانتظار أو تناول جرعة ثانية من الميزوبروستول أو تدخل جراحي لتنظيف رحمك.

متى يمكنني استخدام وسائل تحديد النسل؟

يمكنك الحمل مجدداً مباشرة بعد إنهاء حملك. إذا كنت لا تريدين الحمل مجدداً، يمكنك البدء في استخدام وسائل تحديد النسل بمجرد انتهاء حملك أو قبل بدء الجماع مرة أخرى.

ما هي المحظورات عند تناول Mifeprex والميزوبروستول؟

لا تتناول أي أدوية أخرى سواء كانت بوصفة أو بدون وصفة طبية (بما في ذلك الأدوية العشبية أو المكملات الغذائية العشبية) في أثناء فترة العلاج دون استشارة موفر رعايتك الصحية عن تلك الأدوية؛ لأنها قد تتداخل مع العلاج. اسأل موفر رعايتك الصحية عن الأدوية التي يمكنك تناولها لتسكين الألم وللآثار الجانبية الأخرى.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة عند تناول Mifeprex والميزوبروستول؟

قد يسبب Mifeprex آثار جانبية خطيرة. راجعي "ما هي أهم المعلومات التي يجب علي معرفتها عن Mifeprex" تقلصات ونزيف. يُتوقع حدوث تقلصات ونزيف مهلي مع هذا العلاج. وغالبًا تعني هذه الأعراض أن العلاج فعال. ولكن في بعض الأحيان قد تعانين من تقلصات ونزيف مع استمرار الحمل. ولذلك عليك المتابعة مع موفر رعايتك الصحية خلال 7 إلى 14 يومًا من تناولك Mifeprex. راجعي "كيف يجب تناول Mifeprex؟" لمعرفة مزيد من المعلومات عن تقييم متابعتك. إذا لم يبدأ النزيف لديك بعد تناول Mifeprex، فعلى الأرجح سيبدأ النزيف بمجرد تناولك الميزوبروستول، وهو الدواء الذي تتناولينه بعد 24 إلى 48 ساعة من تناول Mifeprex. قد يستمر النزيف أو التدفق لمدة 9 إلى 16 يومًا في المتوسط وربما يستمر حتى 30 يومًا. قد يكون نزيفك مشابه لنزيف دورتك الشهرية الغزيرة أو ربما أغزر منها. وربما تلاحظين وجود أنسجة وكتل دموية متخثرة. ويُعد هذا جزءًا متوقعًا نتيجة خروج الحمل. من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا لتناول علاج Mifeprex: الغثيان والوهن والخُمى/القشعريرة والتقيؤ والصداع والإسهال والدوار. سيُخبرك موفر رعايتك كيف تتعاملين مع ألمك أو الآثار الجانبية. وهذه ليست جميع الآثار الجانبية المحتملة لتناول Mifeprex. اتصلي بموفر رعايتك الصحية للحصول على المشورة الطبية حول الآثار الجانبية التي تُزعجك والتي طال وجودها. يُمكنك إبلاغ إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية عن الآثار الجانبية على الرقم 1-800-FDA-1088.

معلومات عامة عن استخدام Mifeprex الآمن والفعال.

في بعض الأحيان تُوصف أدوية لأغراض مختلفة عما هو مذكور في دليل الدواء. يلخص دليل الدواء هذا معظم المعلومات المهمة عن Mifeprex. إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات، تحدثي مع موفر رعايتك الصحية. يمكنك ان تسأل موفر رعايتك الصحية عن معلومات Mifeprex الموجهة لاختصاصيي الرعاية الصحية.

للحصول على المزيد من المعلومات عن Mifeprex، يمكنك زيارة www.earlyoptionpill.com أو الاتصال على Early Option 1-877-4 (1-877-432-7596).

صُنِعَ من أجل:



شركة مختبرات دانكو محدودة المسؤولية • P.O. Box 4816 • New York, NY 10185
www.earlyoptionpill.com • 1-877-4 Early Option (1-877-432-7596)