

Mifeprex® (Mifepristone)

Tablets, 200 mg

用藥指南

Mifeprex (MIF-eh-prex) (美服醑酮) 片劑，口服使用

請在服用 Mifeprex* 和米索前列醇之前仔細閱讀本資訊。這將有助於您了解治療的作用方式。本用藥指南無法替代您與醫療健保提供者的溝通。

我應該了解關於 Mifeprex 的哪些最重要資訊？

我應該關注哪些症狀？雖然絞痛和出血是終止妊娠的預期後果，但在極少情況下，墮胎、手術流產、藥物流產或分娩後可能會出現嚴重且可能危及生命的出血、感染或其他問題。在這種情形下需要盡快就醫。嚴重感染已在極少數病例中造成死亡。目前沒有資訊顯示使用 Mifeprex 和米索前列醇曾造成死亡。如有任何問題、顧慮或難題，或是您擔心任何副作用或症狀，可以與您的醫療健保提供者聯絡。您可以在此處寫下醫療健保提供者的電話號碼_____。

如果您出現下列任何症狀，請務必要立即聯絡您的醫療健保提供者：

- **嚴重出血。**如果您連續兩小時，每小時的出血量大到足以浸透兩條全尺寸厚衛生棉，或您擔心大量出血。每 100 名女性中大約有 1 名會遭遇嚴重出血，需要手術治療（抽吸刮宮或子宮搔刮術）。
- **腹痛或「感到不舒服」。**如果您在服用米索前列醇後 24 小時以上感到腹痛或不適，或是「感到不舒服」，包括虛弱、噁心、嘔吐或腹瀉，伴有或不伴有發燒，則應立即聯絡您的醫療健保提供者。這些症狀可能是嚴重感染或其他問題的先兆（包括異位妊娠、子宮外妊娠）。
- **發燒。**在治療後，如果您出現持續 4 小時以上的 100.4°F 或以上的發燒，則應立即聯絡您的醫療健保提供者。發燒可能是嚴重感染或其他問題的症狀。

如果您無法聯絡到醫療健保提供者，請前往最近的醫院急診室。

如果您在使用搭配米索前列醇的 Mifeprex 後仍處於妊娠狀態，該怎麼辦？如果您仍處於妊娠狀態，醫療健保提供者將與您討論手術程式來終止妊娠。在許多情形下，該手術可以在辦公室/診所內進行。如果妊娠未終止，那麼嬰兒出生缺陷機率尚未可知。

與您的醫療健保提供者討論。在服用 Mifeprex 之前，您應閱讀服藥說明，並且您和您的醫療健保提供者應討論服用 Mifeprex 的益處和風險。

Mifeprex 是什麼？

Mifeprex 與另一種名為米索前列醇的處方藥搭配使用，以終止早期妊娠。

早期妊娠是指自上次月經期開始後的 70 天 (10 週) 或以內。Mifeprex 未獲得允許用於終止早期之後的妊娠。Mifeprex 會阻滯妊娠繼續進行所需的激素。您在第 1 天服用 Mifeprex 時，還需要在服用 24 到 48 小時後服用名為米索前列醇的另一種藥物，從而令妊娠從您的子宮內消失。

妊娠可能會在您服用 Mifeprex 和米索前列醇的 2 到 24 小時內從您的子宮內消失。當妊娠從子宮內消失時，您將出現較平常月經期更為嚴重的出血和絞痛。服用 Mifeprex 的 100 名女性中約有 2 到 7 名將需要手術，因為其妊娠沒有完全從子宮內消失或是為了停止出血。

哪些人不應服用 Mifeprex?

部分女性不應服用 Mifeprex。如果您符合下列條件，請勿服用 Mifeprex：

- 妊娠超過 70 天 (10 週)。您的醫療健保提供者可能會進行臨床檢查、超聲檢查或其他檢查，以確定您的妊娠時間。
- 正在使用 IUS (子宮內避孕器或避孕系統)。服用 Mifeprex 之前必須將其取出。
- 曾被醫療健保提供者告知您有子宮外妊娠 (異位妊娠)。
- 腎上腺有問題 (慢性腎上腺衰竭)。
- 服用稀釋血液的藥物。
- 有出血問題。
- 患有紫質症。
- 服用某種類固醇藥物。
- 對美服醌酮、米索前列醇，或含有米索前列醇的藥物過敏，例如 Cytotec 或 Arthrotec。

在服用本藥物前，如果您不確定自己的全部身體狀況，請詢問您的醫療健保提供者，以了解自己是否能服用 Mifeprex。

我在服用 Mifeprex 之前應告知醫療健保提供者哪些內容？

如果您符合下列條件，請在服用 Mifeprex 之前告知您的醫療健保提供者：

- 無法在首次看診後大約 7 到 14 天內隨診。
- 正在哺餵母乳。Mifeprex 可能會進入您的母乳。Mifeprex 和米索前列醇治療方案對母乳哺餵的嬰兒或乳製品的影響尚不清楚。
- 正在服用藥物，包括處方藥、非處方藥、維他命和草藥補充品。Mifeprex 和某些其他藥物如同時使用可能會相互影響。這可能會產生副作用。

我應如何服用 Mifeprex？

- Mifeprex 將由診所、醫務室或醫院的醫療健保提供者提供給您。
- 您和您的醫療健保提供者將為您規劃服用米索前列醇的最適合地點，因為它通常會在您服用後的 2 到 24 小時內造成出血、絞痛、噁心、腹瀉和其他症狀。
- 大部分女性會在服用米索前列醇片後的 2 到 24 小時內終止妊娠。

遵循下方關於如何服用 Mifeprex 和米索前列醇的說明：

Mifeprex (1 片) 口服 + 米索前列醇 (4 片) 含服

第 1 天：

- 口服 1 片 Mifeprex。

服用 Mifeprex 後的 24 到 48 小時：

- 在兩側口腔頰 (牙齒和臉頰之間的區域—參見圖 A) 內各含服 2 片米索前列醇 (共 4 片) 30 分鐘，然後用水或其他液體送服任何殘留藥物。
- 如果您在服用 Mifeprex 的 24 小時內或 48 小時後服用米索前列醇，則藥物可能無法發揮正常作用。
- Misoprostol 通常會造成絞痛、噁心、腹瀉及其他症狀。您的醫療健保提供者可能為您開具一些藥物回家服用，以應對這些症狀。




圖 A (2 片含在左臉頰和牙齦之間，2 片含在右臉頰和牙齦之間)。

在第 7 到 14 天之間隨診評估：

- 此隨診評估非常重要。您必須在服用 Mifeprex 之後大約 7 到 14 天隨訪醫療健保提供者，以確保您的身體狀態良好、不再出血，且妊娠已從子宮內消失。
- 您的醫療健保提供者將評估您的妊娠是否已從子宮內消失。如果您的妊娠狀態繼續，那麼嬰兒出生缺陷的機率尚不可知。如果您仍處於妊娠狀態，醫療健保提供者將與您討論手術程式來終止妊娠。
- 如果您的妊娠已終止，但尚未完全從子宮內排出，那麼您的醫療健保提供者將與您討論其他選擇，包括等待、服用另一劑米索前列醇，或接受手術來清宮。

我應何時開始避孕？

妊娠結束之後，您就可能再次懷孕。如果您不想再次懷孕，則在妊娠結束後或再次開始性生活前盡快採用避孕措施。

我在服用 Mifeprex 和米索前列醇的過程中應避免什麼？

如未事先詢問您的醫療健保提供者，請勿在治療期間服用任何其他處方藥或非處方藥（包括草藥或補充品），因為這些藥物可能會妨礙治療。向您的醫療健保提供者詢問可服用哪些藥物來應對疼痛或其他副作用。

Mifeprex 和米索前列醇有哪些可能的副作用？

Mifeprex 可能會造成嚴重的副作用。請參見「我應該了解哪些關於 Mifeprex 的最重要資訊？」絞痛和出血。本治療預期會出現絞痛和陰道出血。通常來說，這類症狀意味著治療正在起效。但有時，您雖然會出現絞痛和出血，但仍處於妊娠狀態。這也是您在服用 Mifeprex 大約 7 到 14 天後必須隨訪醫療健保提供者的原因。請參見「我應如何服用 Mifeprex」，以了解關於隨診評估的更多資訊。如果您在服用 Mifeprex 後已經不出血，則可能會在服用米索前列醇後開始出血，該藥物在服用 Mifeprex 的 24 到 48 小時後服用。出血或點狀出血預計會出現平均 9 到 16 天，最長可能會持續 30 天。您的出血量可能類似於，或大於正常的量月經。您可能會看到血塊和組織。這是終止懷孕的預期內結果。

Mifeprex 治療的最常見副作用包括：噁心、虛弱、發燒/寒顫、嘔吐、頭痛、腹瀉和頭暈。您的醫療健保提供者將告訴您如何緩解疼痛或其他副作用。這些並不是 Mifeprex 的全部可能副作用。

請致電您的醫療健保提供者，以獲取應對任何困擾您或不消失的副作用的醫療建議。您可以撥打 1-800-FDA-1088 向 FDA 報告副作用。

關於安全有效使用 Mifeprex 的一般資訊

醫生有時會針對未列於用藥指南中的其他原因而開具藥物。本用藥指南概述了關於 Mifeprex 的最重要資訊。如果您需要更多資訊，請諮詢您的醫療健保提供者。您還可以向醫療健保提供者詢問專為醫療健保專業人士提供的 Mifeprex 相關資訊。

如欲了解關於 Mifeprex 的更多資訊，請造訪 www.earlyoptionpill.com 或撥打電話 1-877-4 Early Option (1-877-432-7596)。

為以下方製造：



Danco Laboratories, LLC • P.O. Box 4816 • New York, NY 10185
1-877-4 Early Option (1-877-432-7596) • www.earlyoptionpill.com